


# PRODUCCIÓN DE CEREZA EN BOLEA

## CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO

### ■ LOCALIZACIÓN

La Solonera  
686 m nivel del mar  
20 km Huesca (AO)



## CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO


### ■ EDAFOLOGÍA

- Textura: ARENOSA
- Profundidad: 0.5-1 m
- Pedregosidad: no factor importante

## CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO

### ■ CLIMATOLOGÍA

- Clima Mediterráneo-Templado



## CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO

### ■ PRODUCCIÓN

- Aragón: 12700 ton/año(21% producción en España)
- Influida por factores climáticos
- 5-10 % producción total regional

## CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO

### ■ MANEJO DE LA EXPLOTACIÓN

- Superficie media: 1 Ha
- 80% superficie total: SECANO!!!!
- Mano de obra: Familiar
- No mecanización

## ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN

### ■ MATERIAL VEGETAL

– Material vegetal obtenido en “Viveros Ebro”

#### ■ VARIEDADES

- BURLAT
- STARKING
- SUMMIT
- LAPINS
- PICOTA

## BURLAT



- Fruto grueso
- Pulpa roja, firme y jugosa
- Maduración precoz
- Resistente al agrietado

## STARKING



- Peso medio del fruto 7-9 grs.
- Forma redondeada-reniforme.
- Buena firmeza
- Resistencia media al rajado

## SUMMIT



- Floración semitemprana
- Muy abundante
- Excesivo sabor

## LAPINS



- Polinizador universal
- Autocompatible
- Precoz
- Muy productivo
- Tolerante al agrietado

## PICOTA



- La más tardía
- Más larga que ancha
- Peso medio 7grs.
- Buena producción
- Resistente al agrietado
- Tipo: Pico colorado

## ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN

- PATRONES
  - STA LUCÍA 64
- POLINIZADORES
  - No necesarios por exceso de producción

## ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN

- CONTROL DE COSECHA
  - Poda: Ocasional
  - S. Formación: Vaso libre
  - Reguladores crecimiento: No se utilizan
  - Aceleradores: No se utilizan
  - Riego: INNECESARIO

## ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN

- AGRIETADO
  - No hay problemas porque no se dan las condiciones
  - Se utilizan variedades resistentes
- PROTECCIÓN FITOSANITARIA
  - Abonos: Sobrante de otros cultivos
  - Aceite blanco: Mosca
  - Fungicida: Cribado

A UN PASO DE SER ECOLÓGICAS!!!!!!!!!!!!

## ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN

- LABORES
  - Escasas (3-4 pases de cultivador para eliminar m.h.)
- RECOLECCIÓN
  - Mediados Junio- mediados Julio
  - A mano(100% consumo fresco)
  - Escalonada: variedades con diferente maduración

## ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN

- CALIBRADO
  - CATEGORIAS
    - Extra > 28 mm
    - 1ª catg: 26-28 mm
    - 2ª catg: 24-26 mm
    - 3ª catg: 22-24 mm
  - Incluye la poda realizada

## ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN

- COMERCIALIZACIÓN
  - Forma asociativa a través de una cooperativa local
  - Venta para consumo fresco
  - Compite con frutos más homogéneos, mejor clasificados y presentados de la ribera del Ebro.
  - Una forma de incrementar el consumo y el conocimiento del producto = DÍA DE LA CEREZA EN BOLEA que se celebra a finales de Junio.